

107 mm

209 mm

Algocit, paracetamol, rastvor za infuziju

Minimalni interval između dve primene leka mora biti najmanje 4 sata.

Minimalni interval između dve primene leka kod pacijenata sa teškom bubrežnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji ili jednak 30 mL/min) mora biti najmanje 6 sati.

Ne sme se dati više od 4 doze u toku 24 sata.

pojedinačna doza paracetamola (mg)

1000,00
750,00
735,00
720,00
705,00
690,00
675,00
660,00
645,00
630,00
615,00
600,00
585,00
570,00
555,00
540,00
525,00
510,00
495,00
480,00
465,00
450,00
435,00
420,00
405,00
390,00
375,00
360,00
345,00
330,00
315,00
300,00
285,00
270,00
255,00
240,00
225,00
210,00
195,00
180,00
165,00
150,00
135,00
120,00
105,00
90,00
75,00
60,00
45,00
30,00
15,00
7,50

Algocit zapremina pojedinačne doze (mL)

100,00
75,00
73,50
72,00
70,50
69,00
67,50
66,00
64,50
63,00
61,50
60,00
58,50
57,00
55,50
54,00
52,50
51,00
49,50
48,00
46,50
45,00
43,50
42,00
40,50
39,00
37,50
36,00
34,50
33,00
31,50
30,00
28,50
27,00
25,50
24,00
22,50
21,00
19,50
18,00
16,50
15,00
13,50
12,00
10,50
9,00
7,50
6,00
4,50
3,00
1,50
0,75

telesna masa pacijenta (kg)

>50
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Algocit je indikovano za kratkotrajno lečenje umereno jakih bolova, posebno nakon operacija ili za kratkotrajnu terapiju povišene telesne temperature, kada je intravenska primena klinički opravdana hitnom potrebom da se ublaži bol ili hipertermija i/ili kada drugi načini primene nisu mogući⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Sažetak karakteristika leka Algocit