

## Kartica-podsetnik za pacijenta pod rizikom kod preekspozicione profilakse (PrEP)

Propisan Vam je lek Gilestra Duo za preekspozicionu profilaksu (PrEP) kao pomoć u smanjenju rizika za nastanak HIV-1 infekcije. Kako bi lek delovao, važno je da ne propuštate doze. Preporučena doza je jedna tableta svaki dan. Lek Gilestra Duo uzimajte tačno onako kako Vam je rekao Vaš lekar.

Kad god je moguće, lek treba uzimati uz obrok.

Kako ne biste zaboravili da uzmete lek:

- Možete ga uključiti u svoju dnevnu rutinu. Uzimajte ga na primer uz ručak ili kad perete zube nakon doručka. Važno je da nađete vreme koje Vam najviše odgovara.
- Možete dodati podsetnik na svoj mobilni telefon ili neki drugi uređaj kako bi Vas svaki dan podsetio kada treba da uzmete lek.
- Takođe možete koristiti i malu kutijicu za lekove u koju raspoređujete tablete za svaku nedelju.
- Kad uzmete lek, možete to označiti na kalendaru. Počevši od prve nedelje, označite dan kada ste počeli sa uzimanjem leka Gilestra Duo, a zatim svaki dan nakon što uzmete lek stavite oznaku na odgovarajući dan. Možete da označite i datum kada ste uzeli prvu tabletu leka Gilestra Duo iz nove bočice. Ako niste sigurni jeste li uzeli tabletu, možete izbrojati tablete preostale u bočici (svaka bočica sadrži 30 tableta).

Počnite ovde

	Pon	Uto	Sre	Čet	Pet	Sub	Ned
1. nedelja							
2. nedelja							
3. nedelja							
4. nedelja							
5. nedelja							
6. nedelja							

Ako na svom telefonu ili računaru koristite kalendar, možete dodati podsetnik za uzimanje leka Gilestra Duo.

Datum kada ste uzeli prvu tabletu leka iz nove bočice (dan/mesec/godina):

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

## Podsetnik za kontrole:

Vaš sledeći termin lekarske kontrole:

Poseta	Datum	Vreme	Lokacija

## Poziv na prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili drugog zdravstvenog radnika. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u *Uputstvu za lek*. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka.

Sumnju na neželjene reakcije na lek možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) putem:

- ONLINE aplikacije dostupne na internet stranici [www.alims.gov.rs](http://www.alims.gov.rs) ili
- popunjavanjem obrasca za prijavu neželjene reakcije za pacijenta koji je dostupan na internet stranici [www.alims.gov.rs](http://www.alims.gov.rs) i slanjem poštom na adresu Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije, Nacionalni centar za farmakovigilancu, Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd, Republika Srbija, ili elektronskom poštom na adresu [nezeljene.reakcije@alims.gov.rs](mailto:nezeljene.reakcije@alims.gov.rs).

Sumnju na neželjene reakcije na lek možete prijaviti i nosiocu dozvole za lek Gilestra Duo:

Actavis d.o.o. Beograd,

Đorđa Stanojevića 12, 11070 Novi Beograd

Telefon: (011) 209 93 00

E-mail: [pharmacovigilanca-RS@actavis.com](mailto:pharmacovigilanca-RS@actavis.com)