

Kartica za pacijenta

KEYTRUDA®

(pembrolizumab)



MSD

Može da uzrokuje neka ozbiljna neželjena dejstva koja mogu ponekad biti opasna po život i dovesti do smrti. Mogu se javiti bilo kada tokom lečenja ili čak i nakon što se Vaše lečenje završi. Možete imati više od jednog neželjenog dejstva u isto vreme.

Odmah se obratite svom lekaru ako se kod Vas jave neki od znakova ili simptoma uključujući i one koji nisu navedeni na ovoj kartici. Vaš lekar Vam može dati druge lekove kako bi se sprečile teže komplikacije i smanjili simptomi. Vaš lekar može odložiti sledeću dozu pembrolizumaba ili prekinuti Vaše lečenje pembrolizumabom.

Za dodatne informacije pročitajte Uputstvo za lek KEYTRUDA koje sadrži informacije za pacijente.

VAŽNO

- Ne pokušavajte da sami lečite neželjena dejstva.
- Nemojte prekidati lečenje pembrolizumabom, osim ako o tome niste razgovarali sa svojim lekarom.
- **Uvek sa sobom nosite ovu karticu**, naročito kada putujete, prilikom odlaska u službu hitnog prijema ili kada morate da posetite drugog lekara.

- Obavezno obavestite svakog zdravstvenog radnika kod koga idete na pregled da ste na terapiji pembrolizumabom i pokažite im ovu karticu.

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u Uputstvu za lek. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) putem:

ONLINE prijave dostupne na internet stranici www.alims.gov.rs ili

popunjavanjem obrasca za prijavu neželjene reakcije za pacijenta koji je dostupan na internet stranici www.alims.gov.rs i slanjem poštom na adresu Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije, Nacionalni centar za farmakovigilancu, Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd, Republika Srbija ili elektronskom poštom na nezeljene.reakcije@alims.gov.rs.

Prijavlivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete kako bi se obezbedilo više informacija o bezbednosti ovog leka.

Odmah obavestite Vašeg lekara ako imate neki od sledećih simptoma:

Pluća

- Nedostatak vazduha
- Bol u grudnom košu
- Kašalj

Creva

- Proliv ili učestalije pražnjenje creva nego inače
- Crne, katranaste i lepljive stolice ili stolice koje sadrže krv ili sluz
- Jaki bolovi u stomaku ili osetljivost stomaka na dodir
- Mučnina ili povraćanje

Jetra

- Mučnina ili povraćanje
- Smanjen osećaj gladi
- Bol sa desne strane stomaka
- Žuta prebojenost kože ili beonjača
- Tamna mokraća
- Povećana sklonost ka krvarenju ili nastanku modrica

Bubrezi

- Promena u količini ili boji mokraće

Upala žlezdi koje luče hormone

- Ubrzani otkucaji srca

- Gubitak ili povećanje telesne mase
- Pojačano znojenje
- Gubitak kose
- Osećaj hladnoće
- Zatvor
- Dublji glas
- Bolovi u mišićima
- Vrtoglavica ili nesvestica
- Glavobolje koje ne prolaze ili neuobičajena glavobolja

Šećerna bolest tipa 1, uključujući dijabetičku ketoacidozu

- Osećaj gladi ili žeđi jači nego obično
- Učestalija potreba za mokrenjem
- Gubitak telesne mase
- Osećaj umora ili mučnine
- Bol u želucu
- Brzo i duboko disanje
- Konfuzija
- Neuobičajena pospanost
- Sladak miris daha
- Sladak ili metalni ukus u ustima
- Drugačiji miris urina ili znoja

Važne kontakt informacije

Ime lekara:

Broj telefona na poslu:

Broj telefona van radnog vremena:

Moje ime:

Moj broj telefona:

Kontakt za hitne slučajeve (Ime i broj):

Važne informacije za zdravstvene radnike

Ovaj pacijent se leči pembrolizumabom, koji može da izazove imunski posredovane neželjene reakcije koje se mogu javiti bilo kada tokom lečenja ili čak i nakon završetka lečenja. Pregledajte pacijenta kako biste uočili moguće znakove i simptome imunski posredovanih neželjenih reakcija. Rana dijagnoza i odgovarajuće zbrinjavanje su od suštinskog značaja za minimizaciju posledica imunski posredovanih neželjenih reakcija.

U slučaju sumnje na imunski posredovane neželjene reakcije, potrebno je obezbediti odgovarajuću procenu radi potvrde etiologije ili isključivanja drugih uzroka. Zavisno od težine neželjene reakcije, potrebno je odložiti primenu pembrolizumaba i primeniti kortikosteroide. Pogledajte Sažetak karakteristika leka pembrolizumaba za detaljne informacije u vezi praćenja i zbrinjavanja imunski posredovanih i drugih neželjenih reakcija za pembrolizumab.

Konsultacija sa onkologom ili drugim lekarom specijalistom može biti korisna prilikom zbrinjavanja imunski posredovanih neželjenih reakcija specifičnih za određeni organ.

**Za dodatne informacije videti
Sažetak karakteristika leka
KEYTRUDA.**



MERCK SHARP & DOHME d.o.o.

Omladinskih brigada (Airport City) 90A/1400
Beograd-Novi Beograd, Srbija

MK-3475-SRB-PTAC-v4

Datum revizije: 09Apr2024