



# Vodič za pacijenta

Ovaj vodič namenjen je osobama kojima je propisan  
lek EYLEA (aflibercept, rastvor za injekciju).

Verzija 4.0, novembar 2025

Audio verzija Vodiča za pacijente v4.0

## Sadržaj

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Vaš vodič za lek EYLEA za vlažnu AMD . . . . . | 3  |
| Vaš vodič za lek EYLEA za DME . . . . .        | 9  |
| Vaš vodič za lek EYLEA za CRVO . . . . .       | 15 |
| Vaš vodič za lek EYLEA za BRVO . . . . .       | 21 |
| Vaš vodič za lek EYLEA za mCNV . . . . .       | 27 |
| Prijavljivanje neželjenih reakcija . . . . .   | 33 |

## Vaš vodič za lek EYLEA®

Lek EYLEA se koristi za lečenje neovaskularne (vlažne) senilne makularne degeneracije (vlažna AMD)

Ovaj vodič je namenjen osobama kojima je propisan lek EYLEA (aflibercept, rastvor za injekciju) za lečenje vlažne AMD.

Lek EYLEA, 2 mg doza, i lek EYLEA, 8 mg doza, ispitivani su kod vlažne AMD i kod dijabetičkog makularnog edema (skraćeno DME). Vaš lekar Vam može propisati ili lek EYLEA 2 mg dozu ili lek EYLEA 8 mg dozu, zavisno od Vaše individualne potrebe. Ako se primenjuje lek EYLEA 2 mg doza, Vaš lekar će koristiti EYLEA rastvor jačine 40 mg/mL. Ako se primenjuje lek EYLEA 8 mg doza, Vaš lekar će koristiti EYLEA rastvor jačine 114,3 mg/mL.

Vodič za pacijenta je dostupan u elektronskom izdanju i dolazi zajedno sa audio verzijom vodiča za pacijenta. Audio verzija je pročitani tekst iz ovog vodiča. Više informacija Vam je dostupno u okviru Uputstva za lek.

Skenirajte odgovarajući QR kod:

Elektronska verzija  
Vodiča:



Audio verzija  
Vodiča:



Uputstvo za lek:



## Lekar Vam je propisao lek EYLEA zato što Vam je postavljena dijagnoza vlažne senilne degeneracije makule ili vlažne AMD.

### Šta je vlažna AMD?

Mrežnjača predstavlja sloj ćelija koje oblažu zadnji zid unutrašnjeg dela oka. Ona prepoznaje svetlost i šalje poruke mozgu, omogućavajući Vam da vidite. Žuta mrlja je važan deo u centru mrežnjače i ona omogućava da se jasno vide detalji objekata koji su ispred Vas, kao što su lica i reči u knjigama.

Vlažna AMD nastaje kad novi, abnormalni krvni sudovi rastu ispod mrežnjače. Do ovoga može doći usled godina starosti i usled nakupljanja proizvoda razgradnje u mrežnjači. Rast ovih abnormalnih krvnih sudova se javlja zbog prisustva viših nivoa proteina zvanog VEGF u oku od normalnih. VEGF je skraćenica od faktor rasta vaskularnog endotela (eng. *vascular endothelial growth factor*) i on je uključen u stvaranje abnormalnih krvnih sudova u oku. Ovi krvni sudovi mogu da propuštaju krv ili druge tečnosti i mogu da izazovu stvaranje ožiljaka na žutoj mrlji. Vremenom, ovo može dovesti do trajnog gubitka centralnog vida.

### Šta je lek EYLEA?

Lek EYLEA je vrsta terapije poznata kao anti-VEGF. Anti-VEGF je skraćenica od anti-faktor rasta vaskularnog endotela, što je opis načina na koji lek EYLEA deluje da zaštiti Vaš vid. Lek EYLEA zaustavlja VEGF, što pomaže da se smanji tečnost u mrežnjači i dovodi do poboljšanja i održavanja Vašeg vida.

Lek EYLEA je rastvor (tečnost) koja se injekcijom ubrizgava u oko. Dostupan je u dozi od 2 mg i dozi od 8 mg. Vaš lekar će odabrati dozu koja najbolje odgovara Vašim individualnim potrebama. Takođe, Vaš lekar će preporučiti raspored lečenja za Vas i vrlo je važno da ga se pridržavate.

## Kome je namenjen lek EYLEA?

Lek EYLEA namenjen je osobama kojima je postavljena dijagnoza vlažne AMD.

## Šta Vaš lekar mora da zna pre početka primene leka EYLEA?

Pre nego što počne Vaše lečenje lekom EYLEA, obavezno recite Vašem lekaru i drugim zdravstvenim radnicima ukoliko:

- Imate infekciju /zapaljenje oka ili oko oka
- Trenutno imate crvenilo oka ili bilo kakav bol u oku
- Mislite da ste možda alergični na jod, neki od lekova protiv bolova ili na neki sastojak leka EYLEA
- Ranije ste imali problema sa primenom injekcije u oko
- Imate glaukom ili ste ranije imali povećan očni pritisak
- Vidite ili ste ranije videli bljeskove svetlosti ili plutajuće mrlje u vidnom polju
- Uzimate bilo koji drugi lek, uključujući i lekove koji se izdaju bez lekarskog recepta
- Ste imali ili ćete imati operaciju oka u periodu od 4 nedelje pre ili posle lečenja lekom EYLEA
- Ste trudni, planirate da zatrudnite ili dojite. Dostupno je vrlo malo informacija o bezbednosti primene leka EYLEA kod trudnica. Lek EYLEA 2 mg doza i lek EYLEA 8 mg doza ne treba primenjivati tokom trudnoće, osim ukoliko korist primene prevazilazi rizike po fetus. Molimo Vas da pre početka primene leka EYLEA razgovarate o tome sa Vašim lekarom. Žene u reproduktivnom periodu treba da primenjuju efikasnu kontracepciju tokom svog lečenja lekom EYLEA. Ukoliko se lečite lekom EYLEA, 2 mg doza, treba da nastavite sa primenom efikasne metode kontracepcije i najmanje tri meseca nakon primene poslednje injekcije. Ukoliko se lečite lekom EYLEA, 8 mg doza, treba da nastavite sa primenom efikasne metode kontracepcije i najmanje četiri meseca nakon primene poslednje injekcije. Male količine leka EYLEA mogu dospeti u majčino mleko. Nisu poznati efekti aflibercepta na novorođenče/odojče koje se hrani majčinim mlekom. Primena leka EYLEA tokom dojenja se ne preporučuje

## **Kako mogu da se pripremim za primenu leka EYLEA?**

Vaš lekar Vam može reći da koristite kapi za oči tokom nekoliko dana pre zakazanog termina. Nakon primene leka vid može da Vam bude zamagljen, tako da ne treba da vozite do kuće. Planirajte da na zakazani termin primanja injekcije povedete prijatelja ili člana porodice ili uredite da na drugi način dođete tamo i vratite se kući bezbedno. Na dan zakazanog termina primanja injekcije ne stavljajte nikakvu šminku.

## **Šta mogu da očekujem nakon primene leka EYLEA?**

Nakon primene injekcije leka EYLEA, Vaš lekar može tražiti od Vas da uradite neke testove oka. Ovo može da podrazumeva merenje očnog pritiska. Nakon primenjene injekcije vid će Vam biti zamagljen, tako da ne treba da planirate da vozite sve dok se Vaš vid ne vrati u normalno stanje.

Tokom nekoliko narednih dana može da Vam se javi zakrvavljenost oka ili pojave plutajućih mrlja u vidnom polju. Oba stanja bi trebalo da se regulišu u toku nekoliko dana - ukoliko do toga ne dođe ili ukoliko se ova stanja pogoršaju, javite se Vašem lekaru.

Neki ljudi mogu da osećaju blagi bol ili nelagodnost u oku nakon primene injekcije. Ukoliko bol ne prođe ili se pojača, javite se Vašem lekaru.

## **Postoje li neželjena dejstva leka EYLEA?**

Kao i svi lekovi, tako i lek EYLEA može da izazove neželjena dejstva. Neće se kod svakog pacijenta koji primenjuje lek EYLEA javiti neželjeno dejstvo. Lek EYLEA može da dovede do istih potencijalnih neželjenih dejstava bilo da je primenjen u dozi od 2 mg ili dozi od 8 mg.

**Obratite se odmah Vašem lekaru ukoliko imate bilo koji znak ili simptom naveden u tabeli ispod, jer to mogu biti znakovi ozbiljne komplikacije lečenja:**

| Stanje                                           | Neki od potencijalnih znakova ili simptoma                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| infekcija/zapaljenje unutar oka                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ bol u oku ili povećana nelagodnost,</li> <li>■ pogoršanje crvenila oka,</li> <li>■ osetljivost na svetlost,</li> <li>■ otok očnog kapka,</li> <li>■ promene vida, kao što su iznenadno pogoršanje vida ili zamagljenje vida</li> </ul>            |
| zamućenje sočiva (katarakta)                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ zamagljen vid,</li> <li>■ pojava senki,</li> <li>■ linije i oblici se više ne vide tako jasno,</li> <li>■ izmene vida u boji (boje izgledaju isprano)</li> </ul>                                                                                  |
| povećanje pritiska u oku                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ vidi se svetlost oivičena oreolom,</li> <li>■ bol u oku,</li> <li>■ pojava crvenila oka,</li> <li>■ mučnina i povraćanje,</li> <li>■ promena vida</li> </ul>                                                                                      |
| rascep ili odvajanje jednog od slojeva mrežnjače | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ iznenadna pojava bljeskova svetlosti,</li> <li>■ iznenadna pojava ili povećanje broja tačaka koje se kreću kroz vidno polje (plutajuće mrlje),</li> <li>■ efekat kao da je deo vidnog polja prekriven zavesom,</li> <li>■ promene vida</li> </ul> |

**Za detaljnu listu neželjenih dejstava pogledajte Uputstvo za lek. Uputstvu za lek možete pritupiti putem QR koda na početnim stranicama ovog vodiča ili se obratite Vašem lekaru.**

## Šta ukoliko sam zabrinut/a ili imam pitanja?

Ukoliko ste zabrinuti ili imate bilo kakvo pitanje, Vaš lekar ili medicinska sestra su prave osobe da popričate o tome. Oni su vrlo iskusni i poznaju Vašu ličnu situaciju, te Vam mogu dati odgovore koji su Vam potrebni.

**Vaša klinika za  
lečenje vida je:**

---

**Kontakt osoba:**

---

**Telefon:**

---

**Adresa:**

---

**E-mail:**

---

**Pečat klinike**

## Vaš vodič za lek EYLEA

Lek EYLEA se koristi za lečenje dijabetičkog makularnog edema (DME)

Ovaj vodič je namenjen osobama kojima je propisan lek EYLEA (aflibercept, rastvor za injekciju) za lečenje DME.

Lek EYLEA, 2 mg doza, i lek EYLEA, 8 mg doza, ispitivani su kod neovaskularne (vlažne) senilne makularne degeneracije (skraćeno: vlažne AMD) i kod DME. Vaš lekar Vam može propisati ili lek EYLEA 2 mg dozu ili lek EYLEA 8 mg dozu, zavisno od Vaše individualne potrebe. Ako se primenjuje lek EYLEA 2 mg doza, Vaš lekar će koristiti EYLEA rastvor jačine 40 mg/mL. Ako se primenjuje lek EYLEA 8 mg doza, Vaš lekar će koristiti EYLEA rastvor jačine 114,3 mg/mL.

Vodič za pacijenta je dostupan u elektronskom izdanju i dolazi zajedno sa audio verzijom vodiča za pacijenta. Audio verzija je pročitani tekst iz ovog vodiča. Više informacija Vam je dostupno u okviru Uputstva za lek.

Skenirajte odgovarajući QR kod:

Elektronska verzija  
Vodiča:



Audio verzija  
Vodiča:



Uputstvo za lek:



# Lekar Vam je propisao lek EYLEA zato što Vam je postavljena dijagnoza dijabetičkog makularnog edema ili skraćeno DME.

## Šta je DME?

Dijabetički makularni edem je stanje koje nastaje kad se tečnost nakupi u mrežnjači. Mrežnjača predstavlja sloj ćelija koje oblažu zadnji zid unutrašnjeg dela oka. Ona prepoznaje svetlost i šalje poruke mozgu, omogućavajući Vam da vidite.

Žuta mrlja je važan deo u centru mrežnjače i ona omogućava da se jasno vide detalji objekata koji su ispred Vas, kao što su lica i reči u knjigama.

Dijabetes prate visoke vrednosti glukoze („šećera“) u krvi ili velike promene glukoze („šećera“) u krvi. Ovo može dovesti do oštećenja malih krvnih sudova i smanjene cirkulacije krvi u oku što vodi ka otoku mrežnjače i pojavi zamagljenog vida. Otok se javlja zbog prisustva viših nivoa proteina zvanog VEGF u oku od normalnih. VEGF je skraćenica od faktor rasta vaskularnog endotela (eng. *vascular endothelial growth factor*) i on dovodi do nastanka krvnih sudova koji propuštaju tečnost u oku, usled čega se javlja otok. Tokom vremena otok može oštetiti mrežnjaču i dovesti do trajnog gubitka centralnog vida.

## Šta je lek EYLEA?

Lek EYLEA je vrsta terapije poznata kao anti-VEGF. Anti-VEGF je skraćenica od anti-faktor rasta vaskularnog endotela, što je opis načina na koji lek EYLEA deluje da zaštiti Vaš vid. Lek EYLEA zaustavlja VEGF, što pomaže da se smanji tečnost u mrežnjači i dovodi do poboljšanja i održavanja Vašeg vida.

Lek EYLEA je rastvor (tečnost) koja se injekcijom ubrizgava u oko. Dostupan je u dozi od 2 mg i dozi od 8 mg. Vaš lekar će odabrati dozu koja najbolje odgovara Vašim individualnim potrebama. Takođe, Vaš lekar će preporučiti raspored lečenja za Vas i vrlo je važno da ga se pridržavate.

## Kome je namenjen lek EYLEA?

Lek EYLEA namenjen je osobama kojima je postavljena dijagnoza DME.

## Šta Vaš lekar mora da zna pre nego počnete lečenje lekom EYLEA?

Pre nego što počne Vaše lečenje lekom EYLEA, obavezno recite Vašem lekaru i drugim zdravstvenim radnicima ukoliko:

- Imate infekciju/zapaljenje oka ili oko oka
- Trenutno imate crvenilo oka ili bilo kakav bol u oku
- Mislite da ste možda alergični na jod, neki od lekova protiv bolova ili na neki sastojak leka EYLEA
- Ranije ste imali problema sa primenom injekcije u oko
- Imate glaukom ili ste ranije imali povećan očni pritisak
- Vidite ili ste ranije videli bljeskove svetlosti ili plutajuće mrlje u vidnom polju
- Uzimate bilo koji drugi lek, uključujući i lekove koji se izdaju bez lekarskog recepta
- Ste imali ili ćete imati operaciju oka u periodu od 4 nedelje pre ili posle lečenja lekom EYLEA
- Ste trudni, planirate da zatrudnite ili dojite. Dostupno je vrlo malo informacija o bezbednosti primene leka EYLEA kod trudnica. Lek EYLEA 2 mg doza i lek EYLEA 8 mg doza, ne treba primenjivati tokom trudnoće, osim ukoliko korist primene prevazilazi rizike po fetus. Molimo Vas da pre početka primene leka EYLEA razgovarate o tome sa Vašim lekarom. Žene u reproduktivnom periodu treba da primenjuju efikasnu kontracepciju tokom svog lečenja lekom EYLEA. Ukoliko se lečite lekom EYLEA, 2 mg doza, treba da nastavite sa primenom efikasne metode kontracepcije i najmanje tri meseca nakon primene poslednje injekcije. Ukoliko se lečite lekom EYLEA, 8 mg doza, treba da nastavite sa primenom efikasne metode kontracepcije i najmanje četiri meseca nakon primene poslednje injekcije. Male količine leka EYLEA mogu dospeti u majčino mleko. Nisu poznati efekti aflibercepta na novorođenče/odojče koje se hrani majčinim mlekom. Primena leka EYLEA tokom dojenja se ne preporučuje.

## Kako mogu da se pripremim za primenu leka EYLEA?

Vaš lekar Vam može reći da koristite kapi za oči tokom nekoliko dana pre zakazanog termina. Nakon primene leka, vid može da Vam bude zamagljen, tako da ne treba da vozite do kuće. Planirajte da na zakazani termin primanja injekcije povedete prijatelja ili člana porodice ili uredite da na drugi način dođete tamo i vratite se kući bezbedno. Na dan zakazanog termina primanja injekcije ne stavljajte nikakvu šminku.

## Šta mogu da očekujem nakon primene leka EYLEA?

Nakon primene injekcije leka EYLEA, Vaš lekar može tražiti od Vas da uradite neke testove oka. Ovo može da podrazumeva merenje očnog pritiska. Nakon primenjene injekcije vid će Vam biti zamagljen, tako da ne treba da planirate da vozite sve dok se Vaš vid ne vrati u normalno stanje.

Tokom nekoliko narednih dana može da Vam se javi zakrvavljenost oka ili pojave plutajućih mrlja u vidnom polju. Oba stanja bi trebalo da se regulišu u toku nekoliko dana - ukoliko do toga ne dođe ili ukoliko se ova stanja pogoršaju, javite se Vašem lekaru.

Neki ljudi mogu da osete blagi bol ili nelagodnost u oku nakon primene injekcije. Ukoliko bol ne prođe ili se pojača, javite se Vašem lekaru.

## Postoje li neželjena dejstva leka EYLEA?

Kao i svi lekovi, tako i lek EYLEA može da izazove neželjena dejstva. Neće se kod svakog pacijenta koji primenjuje lek EYLEA javiti neželjeno dejstvo. Lek EYLEA može da dovede do istih potencijalnih neželjenih dejstava bilo da je primenjen u dozi od 2 mg ili dozi od 8 mg.

**Obratite se odmah Vašem lekaru ukoliko imate bilo koji znak ili simptom naveden u tabeli ispod, jer to mogu biti znakovi ozbiljne komplikacije lečenja:**

| Stanje                                           | Neki od potencijalnih znakova ili simptoma                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| infekcija/zapaljenje unutar oka                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ bol u oku ili povećana nelagodnost,</li> <li>■ pogoršanje crvenila oka,</li> <li>■ osetljivost na svetlost,</li> <li>■ otok očnog kapka,</li> <li>■ promene vida, kao što su iznenadno pogoršanje vida ili zamagljenje vida</li> </ul>            |
| zamućenje sočiva (katarakta)                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ zamagljen vid,</li> <li>■ pojava senki,</li> <li>■ linije i oblici se više ne vide tako jasno,</li> <li>■ izmene vida u boji (boje izgledaju isprano)</li> </ul>                                                                                  |
| povećanje pritiska u oku                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ vidi se svetlost oivičena oreolom,</li> <li>■ bol u oku,</li> <li>■ pojava crvenila oka,</li> <li>■ mučnina i povraćanje,</li> <li>■ promena vida</li> </ul>                                                                                      |
| rascep ili odvajanje jednog od slojeva mrežnjače | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ iznenadna pojava bljeskova svetlosti,</li> <li>■ iznenadna pojava ili povećanje broja tačaka koje se kreću kroz vidno polje (plutajuće mrlje),</li> <li>■ efekat kao da je deo vidnog polja prekriven zavesom,</li> <li>■ promene vida</li> </ul> |

**Za detaljnu listu neželjenih dejstava pogledajte Uputstvo za lek. Uputstvu za lek možete pritupiti putem QR koda na početnim stranicama ovog vodiča ili se obratite Vašem lekaru.**

## Šta ukoliko sam zabrinut/a ili imam pitanja?

Ukoliko ste zabrinuti ili imate bilo kakvo pitanje, Vaš lekar ili medicinska sestra su prave osobe da popričate o tome. Oni su vrlo iskusni i poznaju Vašu ličnu situaciju, te Vam mogu dati odgovore koji su Vam potrebni.

**Vaša klinika za  
lečenje vida je:**

---

**Kontakt osoba:**

---

**Telefon:**

---

**Adresa:**

---

**E-mail:**

---

**Pečat klinike**

## Vaš vodič za lek EYLEA

Lek EYLEA se koristi za lečenje makularnog edema koji se javlja kao posledica okluzije centralne retinalne vene (CRVO)

Ovaj vodič je namenjen osobama kojima je propisan lek EYLEA u dozi od 2 mg (aflibercept, rastvor za injekciju) za lečenje CRVO.

Lek EYLEA, 2 mg doza, i lek EYLEA, 8 mg doza, ispitivani su kod neovaskularne (vlažne) senilne degeneracije makule (skraćeno: vlažne AMD) i kod dijabetičkog makularnog edema (skraćeno: DME). Lek EYLEA, 8 mg doza, nije ispitivan za indikaciju CRVO.

Vodič za pacijenta je dostupan u elektronskom izdanju i dolazi zajedno sa audio verzijom vodiča za pacijenta. Audio verzija je pročitani tekst iz ovog vodiča. Više informacija Vam je dostupno u okviru Uputstva za lek.

Skenirajte odgovarajući QR kod:

Elektronska verzija  
Vodiča:



Audio verzija  
Vodiča:



Uputstvo za lek:



## Lekar Vam je propisao lek EYLEA zato što Vam je postavljena dijagnoza makularnog edema koji se javlja kao posledica okluzije centralne retinalne vene ili CRVO.

### Šta je CRVO?

Mrežnjača predstavlja sloj ćelija koje oblažu zadnji zid unutrašnjeg dela oka. Ona prepoznaje svetlost i šalje poruke mozgu, omogućavajući Vam da vidite.

Žuta mrlja je važan deo u centru mrežnjače i ona omogućava da se jasno vide detalji objekata koji su ispred Vas, kao što su lica i reči u knjigama.

Mrežnjača ima jednu glavnu arteriju i jednu glavnu venu. Kako starimo, elastičnost krvnih sudova se menja i oni lakše mogu postati zapušeni ili zakrčeni. CRVO nastaje kada se blokira centralna vena mrežnjače. Ovo je poput tromboze u mrežnjači i tada dolazi do nakupljanja krvi u krvnom sudu. Ovo utiče da mrežnjača krene da otpušta VEGF. VEGF je skraćenica od faktor rasta vaskularnog endotela (eng. *vascular endothelial growth factor*) i on je uključen u proces kojim krvni sudovi postaju propustljivi za tečnost, kao i u proces nastanka novih krvnih sudova. Ovi propustljivi krvni sudovi dovode do otoka i nakupljanja neželjene krvi u oku, što može oštetiti mrežnjaču. U isto vreme, prvobitna blokada centralne vene može i dalje postojati i doprineti pogoršanju problema. Kao rezultat, Vaš centralni vid može biti ozbiljno narušen.

### Šta je lek EYLEA?

Lek EYLEA je vrsta terapije poznata kao anti-VEGF. Anti-VEGF je skraćenica od anti-faktor rasta vaskularnog endotela, što je opis načina na koji lek EYLEA deluje da zaštiti Vaš vid. Lek EYLEA zaustavlja VEGF, što pomaže da se smanji tečnost u mrežnjači i dovodi do poboljšanja i održavanja Vašeg vida.

Lek EYLEA je rastvor (tečnost) koja se injekcijom ubrizgava u oko. Za lečenje CRVO, dostupan je u dozi od 2 mg. Vaš lekar će preporučiti raspored lečenja za Vas i vrlo je važno da ga se pridržavate.

## Kome je namenjen lek EYLEA?

Lek EYLEA namenjen je osobama kojima je postavljena dijagnoza CRVO.

## Šta Vaš lekar mora da zna pre početka primene leka EYLEA?

Pre nego što počne Vaše lečenje lekom EYLEA, obavezno recite Vašem lekaru i drugim zdravstvenim radnicima ukoliko:

- Imate infekciju/zapaljenje oka ili oko oka
- Trenutno imate crvenilo oka ili bilo kakav bol u oku
- Mislite da ste možda alergični na jod, neki od lekova protiv bolova ili na neki sastojak leka EYLEA
- Ranije ste imali problema sa primenom injekcije u oko
- Imate glaukom ili ste ranije imali povećan očni pritisak
- Vidite ili ste ranije videli bljeskove svetlosti ili plutajuće mrlje u vidnom polju
- Uzimate bilo koji drugi lek, uključujući i lekove koji se izdaju bez lekarskog recepta
- Ste imali ili ćete imati operaciju oka u periodu od 4 nedelje pre ili posle lečenja lekom EYLEA
- Ste trudni, planirate da zatrudnite ili dojite. Dostupno je vrlo malo informacija o bezbednosti primene leka EYLEA kod trudnica. Lek EYLEA 2 mg doza i lek EYLEA 8 mg doza, ne treba primenjivati tokom trudnoće, osim ukoliko korist primene prevazilazi rizike po fetus. Molimo Vas da pre početka primene leka EYLEA razgovarate o tome sa Vašim lekarom. Žene u reproduktivnom periodu treba da primenjuju efikasnu kontracepciju tokom svog lečenja i najmanje tri meseca nakon primene poslednje injekcije leka EYLEA. Male količine leka EYLEA mogu dospeti u majčino mleko. Nisu poznati efekti aflibercepta na novorođenče/odojče koje se hrani majčinim mlekom. Primena leka EYLEA tokom dojenja se ne preporučuje.

## **Kako mogu da se pripremim za primenu leka EYLEA?**

Vaš lekar Vam može reći da koristite kapi za oči tokom nekoliko dana pre zakazanog termina. Nakon primene leka vid može da Vam bude zamagljen, tako da ne treba da vozite do kuće. Planirajte da na zakazani termin primanja injekcije povedete prijatelja ili člana porodice ili uredite da na drugi način dođete tamo i vratite se kući bezbedno. Na dan zakazanog termina primanja injekcije ne stavljajte nikakvu šminku.

## **Šta mogu da očekujem nakon primene leka EYLEA?**

Nakon primene injekcije leka EYLEA, Vaš lekar može tražiti od Vas da uradite neke testove oka. Ovo može da podrazumeva merenje očnog pritiska. Nakon primenjene injekcije vid će Vam biti zamagljen, tako da ne treba da planirate da vozite sve dok se Vaš vid ne vrati u normalno stanje.

Tokom nekoliko narednih dana može da Vam se javi zakrvavljenost oka ili pojave plutajućih mrlja u vidnom polju. Oba stanja bi trebalo da se regulišu u toku nekoliko dana - ukoliko do toga ne dođe ili ukoliko se ova stanja pogoršaju, javite se Vašem lekaru.

Neki ljudi mogu da osete blagi bol ili nelagodnost u oku nakon primene injekcije. Ukoliko bol ne prođe ili se pojača, javite se Vašem lekaru.

## **Postoje li neželjena dejstva leka EYLEA?**

Kao i svi lekovi, tako i lek EYLEA može da izazove neželjena dejstva. Neće se kod svakog pacijenta koji primenjuje lek EYLEA javiti neželjeno dejstvo.

**Obratite se odmah Vašem lekaru ukoliko imate bilo koji znak ili simptom naveden u tabeli ispod, jer to mogu biti znakovi ozbiljne komplikacije lečenja:**

| Stanje                                           | Neki od potencijalnih znakova ili simptoma                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| infekcija/zapaljenje unutar oka                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ bol u oku ili povećana nelagodnost,</li> <li>■ pogoršanje crvenila oka,</li> <li>■ osetljivost na svetlost,</li> <li>■ otok očnog kapka,</li> <li>■ promene vida, kao što su iznenadno pogoršanje vida ili zamagljenje vida</li> </ul>            |
| zamućenje sočiva (katarakta)                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ zamagljen vid,</li> <li>■ pojava senki,</li> <li>■ linije i oblici se više ne vide tako jasno,</li> <li>■ izmene vida u boji (boje izgledaju isprano)</li> </ul>                                                                                  |
| povećanje pritiska u oku                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ vidi se svetlost oivičena oreolom,</li> <li>■ bol u oku,</li> <li>■ pojava crvenila oka,</li> <li>■ mučnina i povraćanje,</li> <li>■ promena vida</li> </ul>                                                                                      |
| rascep ili odvajanje jednog od slojeva mrežnjače | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ iznenadna pojava bljeskova svetlosti,</li> <li>■ iznenadna pojava ili povećanje broja tačaka koje se kreću kroz vidno polje (plutajuće mrlje),</li> <li>■ efekat kao da je deo vidnog polja prekriven zavesom,</li> <li>■ promene vida</li> </ul> |

**Za detaljnu listu neželjenih dejstava pogledajte Uputstvo za lek. Uputstvu za lek možete pritupiti putem QR koda na početnim stranicama ovog vodiča ili se obratite Vašem lekaru.**

## Šta ukoliko sam zabrinut/a ili imam pitanja?

Ukoliko ste zabrinuti ili imate bilo kakvo pitanje, Vaš lekar ili medicinska sestra su prave osobe da popričate o tome. Oni su vrlo iskusni i poznaju Vašu ličnu situaciju, te Vam mogu dati odgovore koji su Vam potrebni.

**Vaša klinika za  
lečenje vida je:**

---

**Kontakt osoba:**

---

**Telefon:**

---

**Adresa:**

---

**E-mail:**

---

**Pečat klinike**

## Vaš vodič za lek EYLEA

Lek EYLEA se koristi za lečenje makularnog edema koji se javlja kao posledica okluzije centralne retinalne vene (BRVO)

Ovaj vodič je namenjen ljudima kojima je propisan lek EYLEA u dozi od 2 mg (aflibercept, rastvor za injekciju) za lečenje BRVO.

Lek EYLEA, 2 mg doza, i lek EYLEA, 8 mg doza, ispitivani su kod neovaskularne (vlažne) senilne degeneracije makule (skraćeno: vlažne AMD) i kod dijabetičkog makularnog edema (skraćeno: DME). Lek EYLEA, 8 mg doza, nije ispitivan za indikaciju BRVO.

Vodič za pacijenta je dostupan u elektronskom izdanju i dolazi zajedno sa audio verzijom vodiča za pacijenta. Audio verzija je pročitani tekst iz ovog vodiča. Više informacija Vam je dostupno u okviru Uputstva za lek.

Skenirajte odgovarajući QR kod:

Elektronska verzija  
Vodiča:



Audio verzija  
Vodiča:



Uputstvo za lek:



## **Lekar Vam je propisao lek EYLEA zato što Vam je postavljena dijagnoza makularnog edema kao posledice okluzije grane retinalne vene ili BRVO.**

### **Šta je BRVO?**

Mrežnjača predstavlja sloj ćelija koje oblažu zadnji zid unutrašnjeg dela oka. Ona prepoznaje svetlost i šalje poruke mozgu, omogućavajući Vam da vidite.

Žuta mrlja je važan deo u centru mrežnjače i ona omogućava da se jasno vide detalji objekata koji su ispred Vas, kao što su lica i reči u knjigama.

Kako starimo, elastičnost krvnih sudova se menja i oni lakše mogu postati zapušeni ili zakrčeni. BRVO nastaje kada se blokira jedna ili više grana glavne vene mrežnjače. Ovo je poput tromboze u jednom delu mrežnjače. Tada dolazi do nakupljanja krvi u krvnom sudu. Ovo utiče da krvni sudovi počnu da otpuštaju VEGF. VEGF je skraćenica od faktor rasta vaskularnog endotela (eng. *vascular endothelial growth factor*) i on je uključen u proces kojim krvni sudovi postaju propustljivi za tečnost, kao i u proces nastanka novih krvnih sudova. Ovi propustljivi krvni sudovi dovode do otoka i nakupljanja krvi u oku. Otok može da zahvati žutu mrlju, i ukoliko se to dogodi, Vaš centralni vid može biti ozbiljno narušen. Tokom vremena, ukoliko se ne uspostavi cirkulacija krvi u ovom delu oka, nervne ćelije u oku mogu odumreti, a Vaš vid se može pogoršati.

### **Šta je lek EYLEA?**

Lek EYLEA je vrsta terapije poznata kao anti-VEGF. Anti-VEGF je skraćenica od anti-faktor rasta vaskularnog endotela, što je opis načina na koji lek EYLEA deluje da zaštiti Vaš vid. Lek EYLEA zaustavlja VEGF, što pomaže da se smanji tečnost u mrežnjači i dovodi do poboljšanja i održavanja Vašeg vida.

Lek EYLEA je rastvor (tečnost) koja se injekcijom ubrizgava u oko. Za lečenje BRVO, dostupan je u dozi od 2 mg. Vaš lekar će preporučiti raspored lečenja za Vas i vrlo je važno da ga se pridržavate.

## Kome je namenjen lek EYLEA?

Lek EYLEA namenjen je osobama kojima je postavljena dijagnoza BRVO.

## Šta Vaš lekar mora da zna pre početka primene leka EYLEA?

Pre nego što počne Vaše lečenje lekom EYLEA, obavezno recite Vašem lekaru i drugim zdravstvenim radnicima ukoliko:

- Imate infekciju/zapaljenje oka ili oko oka
- Trenutno imate crvenilo oka ili bilo kakav bol u oku
- Mislite da ste možda alergični na jod, neki od lekova protiv bolova ili na neki sastojak leka EYLEA
- Ranije ste imali problema sa primenom injekcije u oko
- Imate glaukom ili ste ranije imali povećan očni pritisak
- Vidite ili ste ranije videli bljeskove svetlosti ili plutajuće mrlje u vidnom polju
- Uzimate bilo koji drugi lek, uključujući i lekove koji se izdaju bez lekarskog recepta
- Ste imali ili ćete imati operaciju oka u periodu od 4 nedelje pre ili posle lečenja lekom EYLEA
- Ste trudni, planirate da zatrudnite ili dojite. Dostupno je vrlo malo informacija o bezbednosti primene leka EYLEA kod trudnica. Lek EYLEA 2 mg doza i lek EYLEA 8 mg doza, ne treba primenjivati tokom trudnoće, osim ukoliko korist primene prevazilazi rizike po fetus. Molimo Vas da pre početka primene leka EYLEA razgovarate o tome sa Vašim lekarom. Žene u reproduktivnom periodu treba da primenjuju efikasnu kontracepciju tokom svog lečenja i najmanje tri meseca nakon primene poslednje injekcije leka EYLEA. Male količine leka EYLEA mogu dospeti u majčino mleko. Nisu poznati efekti aflibercepta na novorođenče/odojče koje se hrani majčinim mlekom. Primena leka EYLEA tokom dojenja se ne preporučuje.

## **Kako mogu da se pripremim za primenu leka EYLEA?**

Vaš lekar Vam može reći da koristite kapi za oči tokom nekoliko dana pre zakazanog termina. Nakon primene leka vid može da Vam bude zamagljen, tako da ne treba da vozite do kuće. Planirajte da na zakazani termin primanja injekcije povedete prijatelja ili člana porodice ili uredite da na drugi način dođete tamo i vratite se kući bezbedno. Na dan zakazanog termina primanja injekcije ne stavljajte nikakvu šminku.

## **Šta mogu da očekujem nakon primene leka EYLEA?**

Nakon primene injekcije leka EYLEA, Vaš lekar može tražiti od Vas da uradite neke testove oka. Ovo može da podrazumeva merenje očnog pritiska. Nakon primenjene injekcije vid će Vam biti zamagljen, tako da ne treba da planirate da vozite sve dok se Vaš vid ne vrati u normalno stanje.

Tokom nekoliko narednih dana može da Vam se javi zakrvavljenost oka ili pojave plutajućih mrlja u vidnom polju. Oba stanja bi trebalo da se regulišu u toku nekoliko dana - ukoliko do toga ne dođe ili ukoliko se ova stanja pogoršaju, javite se Vašem lekaru.

Neki ljudi mogu da osete blagi bol ili nelagodnost u oku nakon primene injekcije. Ukoliko bol ne prođe ili se pojača, javite se Vašem lekaru.

## **Postoje li neželjena dejstva leka EYLEA?**

Kao i svi lekovi, tako i lek EYLEA može da izazove neželjena dejstva. Neće se kod svakog pacijenta koji primenjuje lek EYLEA javiti neželjeno dejstvo.

**Obratite se odmah Vašem lekaru ukoliko imate bilo koji znak ili simptom naveden u tabeli ispod, jer to mogu biti znakovi ozbiljne komplikacije lečenja:**

| Stanje                                           | Neki od potencijalnih znakova ili simptoma                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| infekcija/zapaljenje unutar oka                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ bol u oku ili povećana nelagodnost,</li> <li>■ pogoršanje crvenila oka,</li> <li>■ osetljivost na svetlost,</li> <li>■ otok očnog kapka,</li> <li>■ promene vida, kao što su iznenadno pogoršanje vida ili zamagljenje vida</li> </ul>            |
| zamućenje sočiva (katarakta)                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ zamagljen vid,</li> <li>■ pojava senki,</li> <li>■ linije i oblici se više ne vide tako jasno,</li> <li>■ izmene vida u boji (boje izgledaju isprano)</li> </ul>                                                                                  |
| povećanje pritiska u oku                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ vidi se svetlost oivičena oreolom,</li> <li>■ bol u oku,</li> <li>■ pojava crvenila oka,</li> <li>■ mučnina i povraćanje,</li> <li>■ promena vida</li> </ul>                                                                                      |
| rascep ili odvajanje jednog od slojeva mrežnjače | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ iznenadna pojava bljeskova svetlosti,</li> <li>■ iznenadna pojava ili povećanje broja tačaka koje se kreću kroz vidno polje (plutajuće mrlje),</li> <li>■ efekat kao da je deo vidnog polja prekriven zavesom,</li> <li>■ promene vida</li> </ul> |

**Za detaljnu listu neželjenih dejstava pogledajte Uputstvo za lek. Uputstvu za lek možete pritupiti putem QR koda na početnim stranicama ovog vodiča ili se obratite Vašem lekaru.**

## Šta ukoliko sam zabrinut/a ili imam pitanja?

Ukoliko ste zabrinuti ili imate bilo kakvo pitanje, Vaš lekar ili medicinska sestra su prave osobe da popričate o tome. Oni su vrlo iskusni i poznaju Vašu ličnu situaciju, te Vam mogu dati odgovore koji su Vam potrebni.

**Vaša klinika za  
lečenje vida je:**

---

**Kontakt osoba:**

---

**Telefon:**

---

**Adresa:**

---

**E-mail:**

---

**Pečat klinike**

## Vaš vodič za lek EYLEA

Lek EYLEA se koristi za lečenje neovaskularizacije sudovnjače kod kratkovidosti (miopna CNV)

Ovaj vodič je namenjen ljudima kojima je propisan lek EYLEA u dozi od 2 mg (aflibercept, rastvor za injekciju) za lečenje miopne CNV.

Lek EYLEA, 2 mg doza, i lek EYLEA, 8 mg doza, ispitivani su kod neovaskularne (vlažne) senilne degeneracije makule (skraćeno: vlažne AMD) i kod dijabetičkog makularnog edema (skraćeno: DME). Lek EYLEA, 8 mg doza, nije ispitivan za indikaciju miopna CNV.

Vodič za pacijenta je dostupan u elektronskom izdanju i dolazi zajedno sa audio verzijom vodiča za pacijenta. Audio verzija je pročitani tekst iz ovog vodiča. Više informacija Vam je dostupno u okviru Uputstva za lek.

Skenirajte odgovarajući QR kod:

Elektronska verzija  
Vodiča:



Audio verzija  
Vodiča:



Uputstvo za lek:



## Lekar Vam je propisao lek EYLEA zato što Vam je postavljena dijagnoza oštećenja vida usled neovaskularizacije sudovnjače kod kratkovidosti ili miopna CNV.

### Šta je miopna CNV?

Mrežnjača predstavlja sloj ćelija koje oblažu zadnji zid unutrašnjeg dela oka. Ona prepoznaje svetlost i šalje poruke mozgu, omogućavajući Vam da vidite.

Kod ljudi sa visokom miopijom (kratkovidošću) dolazi do uvećanja ili izduženja očne jabučice. Ovo može dovesti do rastezanja i istanjenja mrežnjače. Ovo tanjenje mrežnjače može izazvati rast novih krvnih sudova iz sudovnjače. Sudovnjača je sloj oka iza mrežnjače koji snabdeva oko krvlju. Rast ovih propustljivih krvnih sudova se javlja zbog prisustva viših nivoa proteina zvanog VEGF u oku od normalnih. VEGF je skraćenica od faktor rasta vaskularnog endotela (eng. *vascular endothelial growth factor*) i uključen je u proces nastanka novih krvnih sudova u oku. Ovi novi krvni sudovi mogu propustiti krv i tečnost u oko, što izaziva zamagljen ili izobličen centralni vid.

### Šta je lek EYLEA?

Lek EYLEA je vrsta terapije poznata kao anti-VEGF. Anti-VEGF je skraćenica od anti-faktor rasta vaskularnog endotela, što je opis načina na koji lek EYLEA deluje da zaštiti Vaš vid. Lek EYLEA zaustavlja VEGF, što pomaže da se smanji tečnost u mrežnjači i dovodi do poboljšanja i održavanja Vašeg vida.

Lek EYLEA je rastvor (tečnost) koja se injekcijom ubrizgava u oko. Za lečenje miopne CNV, dostupan je u dozi od 2 mg. Vaš lekar će preporučiti raspored lečenja za Vas i vrlo je važno da ga se pridržavate.

## Kome je namenjen lek EYLEA?

Lek EYLEA namenjen je osobama kojima je postavljena dijagnoza miopne CNV.

## Šta Vaš lekar mora da zna pre početka primene leka EYLEA?

Pre nego što počne Vaše lečenje lekom EYLEA, obavezno recite Vašem lekaru i drugim zdravstvenim radnicima ukoliko:

- Imate infekciju/zapaljenje oka ili oko oka
- Trenutno imate crvenilo oka ili bilo kakav bol u oku
- Mislite da ste možda alergični na jod, neki od lekova protiv bolova ili na neki sastojak leka EYLEA
- Ranije ste imali problema sa primenom injekcije u oko
- Imate glaukom ili ste ranije imali povećan očni pritisak
- Vidite ili ste ranije videli bljeskove svetlosti ili plutajuće mrlje u vidnom polju
- Uzimate bilo koji drugi lek, uključujući i lekove koji se izdaju bez lekarskog recepta
- Ste imali ili ćete imati operaciju oka u periodu od 4 nedelje pre ili posle lečenja lekom EYLEA
- Ste trudni, planirate da zatrudnite ili dojite. Dostupno je vrlo malo informacija o bezbednosti primene leka EYLEA kod trudnica. Lek EYLEA 2 mg doza i lek EYLEA 8 mg doza, ne treba primenjivati tokom trudnoće, osim ukoliko korist primene prevazilazi rizike po fetus. Molimo Vas da pre početka primene leka EYLEA razgovarate o tome sa Vašim lekarom. Žene u reproduktivnom periodu treba da primenjuju efikasnu kontracepciju tokom svog lečenja i najmanje tri meseca nakon primene poslednje injekcije leka EYLEA. Male količine leka EYLEA mogu dospeti u majčino mleko. Nisu poznati efekti aflibercepta na novorođenče/odojče koje se hrani majčinim mlekom. Primena leka EYLEA tokom dojenja se ne preporučuje.

## **Kako mogu da se pripremim za primenu leka EYLEA?**

Vaš lekar Vam može reći da koristite kapi za oči tokom nekoliko dana pre zakazanog termina. Nakon primene leka vid može da Vam bude zamagljen, tako da ne treba da vozite do kuće. Planirajte da na zakazani termin primanja injekcije povedete prijatelja ili člana porodice ili uredite da na drugi način dođete tamo i vratite se kući bezbedno. Na dan zakazanog termina primanja injekcije ne stavljajte nikakvu šminku.

## **Šta mogu da očekujem nakon primene leka EYLEA?**

Nakon primene injekcije leka EYLEA, Vaš lekar može tražiti od Vas da uradite neke testove oka. Ovo može da podrazumeva merenje očnog pritiska. Nakon primenjene injekcije vid će Vam biti zamagljen, tako da ne treba da planirate da vozite sve dok se Vaš vid ne vrati u normalno stanje.

Tokom nekoliko narednih dana može da Vam se javi zakrvavljenost oka ili pojave plutajućih mrlja u vidnom polju. Oba stanja bi trebalo da se regulišu u toku nekoliko dana - ukoliko do toga ne dođe ili ukoliko se ova stanja pogoršaju, javite se Vašem lekaru.

Neki ljudi mogu da osećaju blagi bol ili nelagodnost u oku nakon primene injekcije. Ukoliko bol ne prođe ili se pojača, javite se Vašem lekaru.

## **Postoje li neželjena dejstva leka EYLEA?**

Kao i svi lekovi, tako i lek EYLEA može da izazove neželjena dejstva. Neće se kod svakog pacijenta koji primenjuje lek EYLEA javiti neželjeno dejstvo.

**Obratite se odmah Vašem lekaru ukoliko imate bilo koji znak ili simptom naveden u tabeli ispod, jer to mogu biti znakovi ozbiljne komplikacije lečenja:**

| Stanje                                           | Neki od potencijalnih znakova ili simptoma                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| infekcija/zapaljenje unutar oka                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ bol u oku ili povećana nelagodnost,</li> <li>■ pogoršanje crvenila oka,</li> <li>■ osetljivost na svetlost,</li> <li>■ otok očnog kapka,</li> <li>■ promene vida, kao što su iznenadno pogoršanje vida ili zamagljenje vida</li> </ul>            |
| zamućenje sočiva (katarakta)                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ zamagljen vid,</li> <li>■ pojava senki,</li> <li>■ linije i oblici se više ne vide tako jasno,</li> <li>■ izmene vida u boji (boje izgledaju isprano)</li> </ul>                                                                                  |
| povećanje pritiska u oku                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ vidi se svetlost oivičena oreolom,</li> <li>■ bol u oku,</li> <li>■ pojava crvenila oka,</li> <li>■ mučnina i povraćanje,</li> <li>■ promena vida</li> </ul>                                                                                      |
| rascep ili odvajanje jednog od slojeva mrežnjače | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ iznenadna pojava bljeskova svetlosti,</li> <li>■ iznenadna pojava ili povećanje broja tačaka koje se kreću kroz vidno polje (plutajuće mrlje),</li> <li>■ efekat kao da je deo vidnog polja prekriven zavesom,</li> <li>■ promene vida</li> </ul> |

**Za detaljnu listu neželjenih dejstava pogledajte Uputstvo za lek. Uputstvu za lek možete pritupiti putem QR koda na početnim stranicama ovog vodiča ili se obratite Vašem lekaru.**

## Šta ukoliko sam zabrinut/a ili imam pitanja?

Ukoliko ste zabrinuti ili imate bilo kakvo pitanje, Vaš lekar ili medicinska sestra su prave osobe da popričate o tome. Oni su vrlo iskusni i poznaju Vašu ličnu situaciju, te Vam mogu dati odgovore koji su Vam potrebni.

**Vaša klinika za  
lečenje vida je:**

**Kontakt osoba:**

**Telefon:**

**Adresa:**

**E-mail:**

**Pečat klinike**

---

---

---

---

---

# Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili drugog zdravstvenog radnika. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u Uputstvu za lek.

Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije na lek možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

- *popunjavanjem ONLINE prijave dostupne na internet stranici [www.alims.gov.rs](http://www.alims.gov.rs) ili*
- *popunjavanjem obrasca za prijavu neželjene reakcije za pacijenta koji je dostupan na internet stranici [www.alims.gov.rs](http://www.alims.gov.rs) i slanjem:*
  - *Poštom na adresu Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije, Nacionalni centar za farmakovigilancu, Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd, Republika Srbija ili*
  - *Elektronskom poštom na adresu [nezeljene.reakcije@alims.gov.rs](mailto:nezeljene.reakcije@alims.gov.rs)*
- *popunjavanjem ONLINE prijave dostupne na internet stranici [www.alims.gov.rs](http://www.alims.gov.rs)*

Sumnju na neželjene reakcije na lek možete prijaviti i nosiocu dozvole za lek EYLEA:

Bayer d.o.o.  
Omladinskih brigada 88b,  
11070 Beograd, Republika Srbija  
telefon: 011 20 70 200  
e-mail: [pv.alpeadria@bayer.com](mailto:pv.alpeadria@bayer.com)

