

Ime i prezime lekara:

.....

.....

.....

.....

.....

Telefon:

.....

.....

.....

Beleške:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Tabela datuma pregleda

Koristite ovu tabelu za beleženje datuma pregleda kod Vašeg lekara:

Datum pregleda	Primenjena kontracepcija

Rezultat testa za trudnoću	Potpis lekara
<input type="checkbox"/> Pozitivan <input type="checkbox"/> Negativan Datum:	
<input type="checkbox"/> Pozitivan <input type="checkbox"/> Negativan Datum:	
<input type="checkbox"/> Pozitivan <input type="checkbox"/> Negativan Datum:	
<input type="checkbox"/> Pozitivan <input type="checkbox"/> Negativan Datum:	
<input type="checkbox"/> Pozitivan <input type="checkbox"/> Negativan Datum:	
<input type="checkbox"/> Pozitivan <input type="checkbox"/> Negativan Datum:	
<input type="checkbox"/> Pozitivan <input type="checkbox"/> Negativan Datum:	
<input type="checkbox"/> Pozitivan <input type="checkbox"/> Negativan Datum:	
<input type="checkbox"/> Pozitivan <input type="checkbox"/> Negativan Datum:	

Kartica za pacijenta koji koristi lek Roaccutan

Roaccutan[®]
izotretinoin

Lek Roaccutan se ne sme uzimati tokom trudnoće.

Lek Roaccutan može ozbiljno da naškodi nerođenom detetu ukoliko se uzima tokom trudnoće.

Ukoliko zatrudnite ili mislite da ste možda trudni, prestanite da uzimate lek Roaccutan i odmah se obratite svom lekaru.

Pažljivo pročitajte Uputstvo za lek pre nego što započnete terapiju.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi sa primenom leka Roaccutan, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Šta morate da radite ako postoji mogućnost da zatrudnite:

- ❶ Morate primenjivati bar 1 visokoefikasnu metodu kontracepcije (npr. unutar materični uložak ili implant) ili pravilno primenjivati 2 efikasne metode kontracepcije koje deluju na različite načine (npr. oralni kontraceptiv zajedno sa kondomom) pre i tokom terapije, kao i mesec dana po završetku terapije.**

- ❗ **Ne smete zatrudneti tokom uzimanja leka Roaccutan, niti još mesec dana po završetku terapije.**
- ❗ **Morate redovno odlaziti na kontrolne preglede i redovno se testirati na trudnoću:**
 - Pre započinjanja terapije morate uraditi test na trudnoću koji mora biti negativan.
 - Kako biste bili sigurni da niste zatrudneli tokom terapije, morate redovno raditi testove na trudnoću, poželjno svakog meseca. Završni test na trudnoću morate da uradite mesec dana po završetku terapije.

Podsetnik za muškarce i žene

Ovaj lek propisan je isključivo Vama, **nemojte ga deliti ni sa kim, a sve neupotrebljene kapsule vratite u apoteku.**

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u Uputstvu za lek. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka.

Sumnju na neželjene reakcije na lek možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) putem:

- ONLINE prijave dostupne na internet stranici www.alims.gov.rs ili
- popunjavanjem obrasca za prijavu neželjene reakcije za pacijenta koji je dostupan na internet stranici www.alims.gov.rs i slanjem poštom na adresu *Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije, Nacionalni centar za farmakovigilancu, Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd, Republika Srbija*, ili elektronskom poštom na adresu nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

Sumnju na neželjene reakcije na lek možete prijaviti i nosiocu dozvole za lek Roaccutan, kompaniji CLINRES FARMACIJA D.O.O. BEOGRAD

- elektronskom poštom na e-mail adresu: drugsafety_rs@clinres-farmacija.com
- na broj telefona +381 11 36 95 068

Kartica za pacijenta

Ime i prezime lekara

.....

.....

.....

.....

.....

Telefon

.....

.....

Beleške

.....

.....