

Rizik od raka

Lek RINVOQ može potencijalno povećati rizik od razvoja raka, naročito raka kože.

Obavestite Vašeg lekara ako primetite bilo kakvu promenu izgleda nekog dela kože ili ako primetite bilo kakvu novu izraslinu na koži.

Rizik od pucanja creva

Lek RINVOQ može povećati rizik od pucanja creva pogotovo ako imate Crohn-ovu bolest. Recite svom lekaru odmah ako imate bolove u stomaku za koje nema objašnjenja i koji nisu očekivani.

Prijavljivanje neželjenih reakcija: Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili drugog zdravstvenog radnika. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u Uputstvu za lek. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije na lek možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) putem: • ONLINE prijave dostupne na internet stranici www.alims.gov.rs ili • popunjavanjem obrasca za prijavu neželjene reakcije za pacijenta koji je dostupan na internet stranici www.alims.gov.rs i slanjem poštom na adresu Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije, Nacionalni centar za farmakovigilancu, Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd, Republika Srbija, ili elektronskom poštom na adresu nezeljene.reakcije@alims.gov.rs. Sumnju na neželjene reakcije na lek možete prijaviti i nosiocu dozvole za lek RINVOQ, ABBVIE D.O.O. BEOGRAD, Beograd - Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 115E, sprat 6, Telefon: 011/441 2300. Kartica za pacijenta za lek Rinvoq dostupna je u elektronskoj formi na sajtu ALIMS-a, u delu Farmakovigilanca/Edukativni materijali.

Vaše ime i prezime:

Ime i prezime lekara koji Vam je propisao lek RINVOQ:

Broj telefona lekara:

Datum kada ste počeli da uzimate lek RINVOQ:

abbvie

RS-UPAD-250002
Verzija 3; januar 2026.

Globalna verzija 5.0 iz februara 2025

Kartica za pacijenta

Vi (ili Vaš staratelj) uvek nosite ovu karticu sa sobom

Pokažite ovu karticu svakom zdravstvenom radniku koji je uključen u Vašu medicinsku negu – npr. Vašem zubaru ili lekaru opšte medicine.

Bezbednosne informacije o leku RINVOQ (upadacitinib) za pacijente

- Ova kartica sadrži važne bezbednosne informacije kojih morate biti svesni - pre i tokom terapije lekom RINVOQ.
- Za više informacija pročitajte Uputstvo za lek.

Rizik od infekcija

Lek RINVOQ može da pogorša postojeću infekciju ili poveća verovatnoću razvoja nove infekcije – npr. tuberkuloze (TBC), herpes zostera ili virusnog hepatitisa. **Odmah obavestite Vašeg lekara ako primetite znake infekcije**, kao što su:

- groznica, znojenje, jeza, gubitak telesne mase, ili kašalj koji ne prolazi – to mogu biti znaci tuberkuloze
- bolan osip na koži sa plikovima – to može biti znak herpes zostera
- umor ili kratak dah – to mogu biti znaci upale pluća

Obavestite Vašeg lekara ako:

- Vam je nedavno dijagnostikovana tuberkuloza ili ste ikada imali tuberkulozu
- Ste nedavno bili u bliskom kontaktu sa osobom koja ima tuberkulozu.

Vakcine – koriste se za sprečavanje infekcija

Tokom ili neposredno pre početka terapije lekom RINVOQ, ne smete primiti žive vakcine (npr. vakcinu protiv gripa u obliku spreja za nos, varičele ili malih boginja/zaušaka/rubeole). Obratite se Vašem lekaru pre nego što primite bilo koju vakcinu – on će znati koje vakcine **ne smete da primite pre ili tokom terapije lekom RINVOQ**.

Rizik od srčane bolesti

Lečenje lekom RINVOQ bilo je povezano sa povećanjem nivoa holesterola (masnoća u krvi).

Vaš lekar će proveravati nivo holesterola dok uzimate lek RINVOQ.

Odmah obavestite Vašeg lekara ako primetite simptome kao što su bol ili stezanje u grudnom košu, jer to mogu biti simptomi srčane bolesti.

Kontracepcija, trudnoća i dojenje

Lek RINVOQ se **ne sme uzimati tokom trudnoće**.

- Koristite **efikasne metode kontracepcije tokom lečenja** lekom RINVOQ i još **najmanje 4 nedelje nakon poslednje doze** ovog leka. Razgovarajte sa Vašim lekarom o efikasnim metodama kontracepcije.
- Odmah obavestite Vašeg lekara ukoliko želite da zatrudnite ili ste zatrudneli.
- **Nemojte da dojite** dok uzimate lek RINVOQ.

Rizik od krvnih ugrušaka u venama ili plućima

Kod primene leka RINVOQ primećeni su krvni ugrušci u venama ili plućima. Odmah obavestite lekara, ukoliko primetite znake krvnih ugrušaka u venama ili plućima, kao što su bol i oticanje nogu, kratak dah ili bol u grudnom košu.