

VAŽNA NEŽELJENA DEJSTVA

Ovaj lek može uticati na funkciju Vaše jetre, Vaš krvni pritisak kao i na određene ćelije krvi koje su važne za odbranu od infekcija.

U SLUČAJU POJAVE BILO KOG OD NAVEDENIH NEŽELJENIH DEJSTAVA, ODMAH SE OBRATITE LEKARU:

- Žuta prebojenost kože ili beonjača, tamniji urin, mučnina ili povraćanje i bol u trbuhu. U tom slučaju, možda imate problema sa jetrom.
- Visoka telesna temperatura (groznica), kašalj, drhtavica, otečene žlezde, otežano ili bolno mokrenje ili konfuzija. U tom slučaju, možda imate neku infekciju.

ZA ŽENE U REPRODUKTIVNOM PERIODU, UKLJUČUJUĆI DEVOJČICE I NJIHOVE RODITELJE/STARATELJE

- Ukoliko ste trudni ili sumnjate da ste trudni ne počinjte terapiju lekom Arteflumid. Vaš lekar može zatražiti da uradite test na trudnoću kako biste bili sigurni.
- Koristite pouzdanu kontracepciju tokom primene leka Arteflumid. Vaš lekar će Vas posavetovati o potencijalnim rizicima za fetus i o potrebi za efikasnom kontracepcijom.
- Obratite se svom lekaru ako želite da promenite metodu kontracepcije ili ako želite da zatrudnite.
- Ako ostanete u drugom stanju ili mislite da ste trudni, prekinite sa uzimanjem teriflunomida i **odmah se obratite svom lekaru.**
- U slučaju trudnoće, Vaš lekar može da preporuči terapiju lekovima koji omogućavaju brzu eliminaciju teriflunomida iz Vašeg organizma.
- Takođe treba da razgovarate sa Vašim lekarom ukoliko dojdite ili planirate da dojdite.
- Za roditelje/staratelje ili devojčice: molimo Vas da se obratite lekaru kada pacijentkinja dobije prvu menstruaciju, kako biste dobili savete o potencijalnom riziku za fetus i potrebi za kontracepcijom.