

Ime i prezime pacijenta: _____

Datum prvog propisivanja leka Teriflunomid Zentiva: _____

Naziv zdravstvene ustanove: _____

Ime i prezime lekara: _____

Kontakt telefon lekara: _____

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili drugog zdravstvenog radnika. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u Uputstvu za lek. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije na lek možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) putem:

- ONLINE prijave dostupne na internet stranici www.alims.gov.rs ili
- popunjavanjem obrasca za prijavu neželjene reakcije za pacijenta koji je dostupan na internet stranici www.alims.gov.rs i slanjem poštom na adresu:

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije,
Nacionalni centar za farmakovigilancu,

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd, Republika Srbija, ili

- elektronskom poštom na adresu nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

Sumnju na neželjene reakcije na lek možete prijaviti i nosiocu dozvole za lek: Zentiva Pharma d.o.o.,
Milenija Popovića 5V, Novi Beograd, 11070 Beograd Srbija

Telefon: +381 11 414 64 70 e-mail: office.serbia@zentiva.com

KARTICA ZA PACIJENTA

Ova Kartica za pacijenta sadrži važne bezbednosne informacije koje treba da znate ukoliko ste na terapiji lekom Teriflunomid Zentiva. Za kompletne informacije pogledajte Uputstvo za lek.



Opšte uputstvo

Molimo Vas da ovu Karticu pokažete svakom lekaru ili zdravstvenom radniku koji je uključen u Vaše medicinsko zbrinjavanje (npr. u hitnim stanjima).

Verzija 1, oktobar 2025.

ZENTIVA

Važna neželjena dejstva

Ovaj lek može uticati na funkciju Vaše jetre, Vaš krvni pritisak kao i na određene ćelije krvi koje su važne za odbranu od infekcija.



U slučaju pojave bilo kog od navedenih neželjenih dejstava, odmah se obratite lekaru.

- Žuta prebojenost kože ili beonjača, tamniji urin, mučnina ili povraćanje i bol u trbuhu. U tom slučaju, možda imate problema sa jetrom.
- Visoka telesna temperatura (groznica), kašalj, drhtavica, otečene žlezde, otežano ili bolno mokrenje ili konfuzija. U tom slučaju, možda imate neku infekciju.

Za žene u reproduktivnom periodu, uključujući devojčice i njihove roditelje/staratelje

- Ukoliko ste trudni ili sumnjate da ste trudni ne počinjte terapiju lekom Teriflunomid Zentiva. Vaš lekar može zatražiti da uradite test na trudnoću kako biste bili sigurni.
- Koristite pouzdanu kontracepciju tokom primene leka Teriflunomid Zentiva. Vaš lekar će Vas posavetovati o potencijalnim rizicima za fetus i o potrebi za efikasnom kontracepcijom.
- Obratite se svom lekaru ako želite da promenite metodu kontracepcije ili ako želite da zatrudnite.



- Ako ostanete u drugom stanju ili mislite da ste trudni, prekinite sa uzimanjem teriflunomida i odmah se obratite svom lekaru.
- U slučaju trudnoće, Vaš lekar može da preporuči terapiju lekovima koji omogućavaju brzu eliminaciju teriflunomida iz Vašeg organizma.
- Takođe treba da razgovarate sa Vašim lekarom ukoliko dojite ili planirate da dojite.
- Za roditelje/staratelje ili devojčice: molimo Vas da se obratite lekaru kada pacijentkinja dobije prvu menstruaciju, kako biste dobili savete o potencijalnom riziku za fetus i potrebi za kontracepcijom.