

- elektronskom poštom na adresu nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

Srbije, Nacionalni centar za farmakovigilancu, Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd, Republika Srbija, ili internet stranici www.alims.gov.rs i slanjem poštom na adresu: Agencija za lekove i medicinska sredstva

- potpunijanjem obrasca za prijavu neželjene reakcije za pacijenta koji je dostupan na

- ONLINE prijave dostupne na internet stranici www.alims.gov.rs ili

(ALIMS) putem:

Sumnju na neželjene reakcije na lek možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije

Uputstvu za lek. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. drugog zdravstvenog radnika. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili

Kontakt telefon lekara:

Ime i prezime lekara:

Naziv zdravstvene ustanove:

Datum prvog propisivanja leka Aubagio:

Ime i prezime pacijenta:

KARTICA ZA PACIJENTA

Ova Kartica za pacijenta sadrži važne bezbednosne informacije koje treba da znate ukoliko ste na terapiji lekom Aubagio®. Za kompletne informacije pogledajte Uputstvo za lek.

Ovaj materijal možete pronaći i preuzeti sa internet stranice Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) u delu Farmakovigilanca/Edukativni materijali.



Opšte uputstvo

Molimo Vas da ovu Karticu pokažete svakom lekaru ili zdravstvenom radniku koji je uključen u Vaše medicinsko zbrinjavanje (npr. u hitnim stanjima).



Važna neželjena dejstva

Ovaj lek može uticati na funkciju Vaše jetre, Vaš krvni pritisak kao i na određene ćelije krvi koje su važne za odbranu od infekcija.

U slučaju pojave bilo kog od navedenih neželjenih dejstava, odmah se obratite lekaru.

- Žuta prebojenost kože ili beonjača, tamniji urin, mučnina ili povraćanje i bol u trbuhu. U tom slučaju, možda imate problema sa jetrom.
- Visoka telesna temperatura (groznica), kašalj, drhtavica, otečene žlezde, otežano ili bolno mokrenje ili konfuzija. U tom slučaju, možda imate neku infekciju.



Za žene u reproduktivnom periodu, uključujući devojčice i njihove roditelje/staratelje

- Ukoliko ste trudni ili sumnjate da ste trudni ne počinjte terapiju lekom Aubagio. Vaš lekar može zatražiti da uradite test na trudnoću kako biste bili sigurni.
- Koristite pouzdanu kontracepciju tokom i nakon primene leka Aubagio. Vaš lekar će Vas posavetovati o potencijalnim rizicima za fetus i o potrebi za efikasnom kontracepcijom.
- Obratite se svom lekaru ako želite da promenite metodu kontracepcije ili ako želite da zatrudnite.
- Ako ostanete u drugom stanju ili mislite da ste trudni, prekinite sa uzimanjem teriflunomida i **odmah se obratite svom lekaru.**
- U slučaju trudnoće, Vaš lekar može da preporuči terapiju lekovima koji omogućavaju brzu eliminaciju leka teriflunomida iz Vašeg organizma.
- Takođe treba da razgovarate sa Vašim lekarom ukoliko dojite ili planirate da dojite.
- Za roditelje/staratelje ili devojčice: molimo Vas da se obratite lekaru kada pacijentkinja dobije prvu menstruaciju, kako biste dobili savete o potencijalnom riziku za fetus i potrebi za kontracepcijom.