

Risagal[®]

2,5 mg

10 mg

15 mg

20 mg

film tableta



**KARTICA SA
UPOZORENJIMA
ZA PACIJENTA**

- » **Imajte ovu karticu uz sebe u svakom trenutku**
- » **Pokažite ovu karticu svakom lekaru ili stomatologu pre lečenja**

Ja sam na antikoagulantnoj terapiji lekom Risagal® (rivaroksaban)

Ime i prezime:

Adresa:

Datum rođenja:

Telesna težina:

Drugi lekovi/stanja:

U hitnom slučaju molim obavestite:

Ime i prezime lekara:

Broj telefona lekara:

Faksimil lekara:

Molim takođe obavestite:

Ime i prezime:

Broj telefona:

Srodstvo:

Obaveštenje za lekare:

- INR vrednosti se ne bi trebale koristiti, jer nisu pouzdana mera antikoagulantne aktivnosti leka Risagal.

Šta treba da znam o leku Risagal?

- Risagal razređuje krv i tako Vas štiti od stvaranja opasnih krvnih ugrušaka.
- Risagal morate uzimati tačno onako kako Vam je lekar propisao. Kako bi osigurali optimalnu zaštitu od stvaranja krvnih ugrušaka, nikad nemojte propustiti dozu leka.
- Ne smete prestati sa uzimanjem leka Risagal bez prethodnog savetovanja sa lekarom, jer se tako može povećati rizik od stvaranja krvnih ugrušaka.
- Obavestite svog lekara ako trenutno uzimate bilo koje druge lekove, ili ste ih nedavno uzimali, ili ih nameravate početi uzimati, pre nego počnete uzimati lek Risagal.
- Obavestite lekara da uzimate lek Risagal pre bilo kakve hirurške intervencije ili invazivnog postupka.

Kada trebam potražiti savet lekara?

Prilikom uzimanja antikoagulantnih lekova kao što je lek Risagal, važno je biti svestan mogućih neželjenih dejstava. Krvarenje je najčešće neželjeno dejstvo.

Ne započinjite primenu leka Risagal bez prethodnog dogovora sa lekarom, ako znate da ste izloženi riziku od krvarenja. Odmah obavestite svog lekara, ako imate neki od znakova ili simptoma krvarenja poput sledećih:

- bol
- oticanje ili nelagodnost
- glavobolju, vrtoglavicu ili slabost
- neuobičajeno stvaranje modrica, krvarenje iz nosa, krvarenje iz desni, rane kojima treba dugo da prestanu da krvare
- menstrualno ili vaginalno krvarenje obilnije nego uobičajeno
- krv u mokraći koja može biti ružičasta ili smeđa, crvenu ili crnu stolicu
- iskašljavanje krvi ili povraćanje krvi ili sadržaja nalik talogu crne kave

Kako uzimati Risagal?

- Kako bi se osigurala optimalna zaštita, lek Risagal:
 - od 2,5 mg može se uzimati sa hranom ili bez nje
 - od 10 mg može se uzimati sa hranom ili bez nje
 - od 15 mg se mora uzimati sa hranom
 - od 20 mg se mora uzimati sa hranom